

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
Дефислёз®**

Регистрационный номер: _____

Торговое название: Дефислёз®

Международное непатентованное название: гипромеллоза

Лекарственная форма: капли глазные

Состав на 1 мл:

активное вещество: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 3 мг

вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия хлорид, динатрия эдетат (соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты 2-водная [трилон Б]), натрия дигидрофосфата дигидрат (натрий фосфорнокислый однозамещённый 2-водный), натрия гидрофосфата додекагидрат (натрий фосфорнокислый двузамещённый 12-водный), вода для инъекций.

Описание: прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или слабо окрашенная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: кератопротекторное средство

Код ATХ: [S01KA02]

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Протектор эпителия роговицы, оказывает смягчающее, смягчающее действие при пониженной секреции слёзной жидкости. За счёт высокой вязкости увеличивается продолжительность контакта препарата с роговицей. Показатель преломления препарата аналогичен естественной слезе. Способствует восстановлению и стабилизации оптических характеристик слёзной плёнки. Оказывает защитное действие по отношению к роговице при пониженной секреции слёзной жидкости и удлиняет действие других глазных капель.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата отсутствуют.

5.6016

Лагофтальм, деформация век, эктропион, состояние после пластических операций на веках, термических ожогов роговицы и конъюнктивы, кератопластики и кератоэктомии.

Буллёзные дистрофические изменения роговицы, эрозия и трофические язвы роговицы, кератопатия, микродефекты роговичного эпителия, в составе комплексной терапии синдрома «сухого глаза».

Проведение гониоскопии, электроретинографии, электроокулографии, эхобиометрии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, осткая фаза химического ожога роговицы и конъюнктивы (до полного удаления токсичных веществ или некротизированных тканей), беременность и лактация.

С осторожностью

У детей до 18 лет препарат следует применять только, если ожидаемая польза превышает возможный риск.

Применение при беременности и в период лактации

Применять препарат в период беременности не рекомендуется.

При необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Способ применения и дозы

Местно. По 1 или 2 капли 4-8 раз в сутки в нижний конъюнктивальный мешок, при необходимости по 1 или 2 капле каждый час. Курс лечения – не менее 2-3 нед.

При проведении гониоскопии, электроретинографии, электроокулографии, эхобиометрического исследования глазного яблока однократно закапывается 1 капля.

Побочное действие

Аллергические реакции, чувство склеивания век (из-за большой вязкости раствора), затуманивание зрения сразу после инстилляции, жжение в глазу, раздражение глаза.

Передозировка

5 6 0 1 6

Данные по передозировке препарата Дефислёр® отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не следует применять одновременно с глазными каплями, содержащими соли металлов.

Особые указания

Контактные линзы удаляют до инстилляции препарата и устанавливают вновь не ранее, чем через 30 мин после закапывания.

Воздействие на способность управления транспортными средствами и механизмами

При возникновении затуманивания зрения после инстилляции необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, до его восстановления.

Форма выпуска

Капли глазные 3 мг/мл. По 5 мл или 10 мл во флаконы с насадкой-дозатором и крышкой завинчивающейся из пластика.

1 флакон из пластика с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищённом от света месте, при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года. После вскрытия флакона использовать в течение 1 месяца.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Предприятие, принимающее претензии/Производитель

Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (ОАО "Синтез")

640008, Россия, г. Курган, проспект Конституции, 7

ЛС-000198-091210



Тел./факс: (3522) 48-16-89

E-mail: real@kurgansintez.ru

Интернет-сайт: <http://www.kurgansintez.ru>

Представитель фирмы

В.И. Петухов



56016