

И Н С Т Р У К Ц И Я
 по медицинскому применению препарата
Берестин®

Регистрационный номер

Торговое название: Берестин®

Лекарственная форма: раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм.

МНН или группировочное название: деготь березовый&

Состав: действующее вещество: дёготь берёзовый (с содержанием фенола от 0,5 до 2,5%).

Описание: густая маслянистая жидкость черного цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: дерматотропные, антисептики и дезинфицирующие средства.

Код ATX: D05AA

Фармакологические свойства

Обладает кератопластическим, антисептическим, противопаразитарным, подсушивающим, противовоспалительным, сосудосуживающим, анестезирующим действием; уменьшает эритему, успокаивает зуд. При инфильтративных процессах в коже оказывает рассасывающее действие.

Показания к применению

Псориаз в стационарной и регрессирующей стадиях, экзема (в том числе микробная и себорейная), нейродермит вне обострения, почесуха, себорея, зуд кожи.

Противопоказания

Острое воспаление кожи, обострение хронических заболеваний кожи, особенно при выраженной экссудации (острая экзема, дерматиты, экссудативный псориаз), поражение сально-волосистых фолликулов (фолликулит, фурункулез, угри, сикоз), заболевания почек, печени, поджелудочной железы, миокарда.

Беременность и лактация

Не рекомендуется применять при беременности, кормлении грудью и женщинам, планирующим беременность.

Способ применения и дозы

Наружно. При экземе, нейродермите и псориазе перед применением проводится удаление корочек или чешуек с помощью масляного компресса. Берестин® наносят на очаги поражения кожи жесткой кисточкой или рукой вначале на 15 минут 1 раз в день, постепенно увеличивая время аппликации до 30 минут. Препарат удаляют ватным или марлевым тампоном, смоченным растительным или вазелиновым маслом. При псориазе и почесухе через 15-30 минут после нанесения рекомендуется принять душ с мылом или гелем для душа, смывая препарат мочалкой или губкой. После удаления с кожи Берестина® очаги поражения смазывают смягчающей мазью или кремом. Суточная доза препарата не должна превышать 6–8 г.

Продолжительность курса лечения – до 4 недель, перерывы между курсами 1–2 мес.

Побочные эффекты

Сразу после нанесения Берестина® иногда наблюдается жжение кожи, одновременно исчезает зуд. Жжение прекращается через 10–15 минут и лишь у немногих больных может сохраняться более длительно. В таких случаях необходимо удалить с кожи препарат через 15 минут и не увеличивать время аппликации при последующем применении. Субъективные ощущения исчезают после 2–3 аппликаций.

В отдельных случаях может возникать раздражение кожи в зоне нанесения. Появление его служит основанием для временного прерывания лечения. Раздражение обычно проходит от применения примочек и паст. Оно не связано с непереносимостью Берестина®.

При нанесении Берестина® на участки кожи с повышенным оволосением или на волосистую часть головы иногда наблюдается развитие фолликулита.

Применение Берестина® на открытых участках кожи (лицо, шея, руки) может спровоцировать появление солнечных ожогов.

Передозировка

При применении Берестина® длительное время на большие площади (более 1/10 поверхности кожи) могут наблюдаться признаки интоксикации, к которым относятся слабость, озноб, тошнота, рвота, понос, головокружение, головная боль, судороги. Моча при этом может приобретать зеленоватую окраску (оливковая моча, карболурия), содержать белок и цилиндры.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Одновременно с Берестином® не назначают сульфаниламидные препараты, производные фенотиазина и другие средства, обладающие свойствами повышать фоточувствительность кожи. Сочетание Берестина® с препаратами, содержащими серу и салициловую кислоту, усиливают его действие.

Особые указания

Перед началом лечения рекомендуется исследовать переносимость Берестина® на ограниченном участке кожи. В процессе лечения необходимо периодически (1–2 раза в месяц) ис-

следовать мочу. Не следует использовать Берестин® длительное время на больших участках кожи (более 1/10 поверхности). С осторожностью применяют Берестин® у детей и лиц с чувствительной кожей, при склонности к фолликулитам, на участках с повышенным оволосением.

Берестин® оставляет темные пятна на постельном и нательном белье, при длительном применении окрашивает кожу в темный цвет. Пятна на белье удаляются нашатырным спиртом (1 столовая ложка на 10 л воды). Темные пятна на коже самостоятельно исчезают вскоре после окончания лечения. Светлые волосы при воздействии на них Берестина® немного темнеют.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм во флаконах из темного стекла по 10, 15, 20, 30, 50, и 100 г. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:
ЗАО “Ретиноиды”, 111123, Москва, ул. Плеханова, д. 2/46 стр.5.
Тел/факс: (495) 684-2187, 234-6118, 234-6119, www.retinoids.ru
Претензии потребителей направлять в адрес производителя.

Представитель ЗАО “Ретиноиды”,
д-р мед. наук

В.И. Альбанова

