

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  
ДЕПРИМ® /DEPRIM®**

Регистрационный номер *А№ 016054/01*

Торговое название препарата: **ДЕПРИМ®**

**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые оболочкой

**Состав:**

Каждая таблетка содержит 60 мг стандартизированного сухого экстракта зверобоя (*Hypericum perforatum L., herba, extractum siccum normatum*) с содержанием общего гиперидина 0.3 мг.

*Вспомогательные вещества:*

ядро: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный;

оболочка: гидроксипропилметилцеллюлоза, полиэтиленгликоль, тальк, карнаубский воск, глазурь зеленая, глазурь синяя, титана диоксид.

**Описание:** круглые двояковыпуклые таблетки зеленого цвета, покрытые оболочкой.

**Фармакотерапевтическая группа:** седативное средство растительного происхождения.  
Код АТХ А13А.

**Фармакологические свойства**

Средство растительного происхождения, оказывает анксиолитическое и антидепрессивное действие. Основные активные вещества зверобоя - гиперидин, псевдогиперидин, гиперфорин и флавоноиды - улучшают функциональное состояние центральной и вегетативной нервной системы.

Деприм® улучшает настроение, повышает психическую и физическую активность, нормализует сон.

**Показания к применению**

Деприм® применяют при снижении настроения, депрессивных состояниях легкой и средней степени тяжести, сопровождающихся тревогой, в т.ч. связанных с климактерическим синдромом, при повышенной чувствительности к перемене погоды.

**Противопоказания**

- повышенная индивидуальная чувствительности к ингредиентам препарата;
- депрессии тяжелой степени, в этом случае следует обратиться к врачу;
- детский возраст до 6 лет.

## **Применение при беременности и периоде грудного вскармливания**

Несмотря на отсутствие данных о вредном воздействии препарата, приём Деprima® в это время возможен только в том случае, если ожидаемая польза для беременной или матери превосходит потенциальный риск для плода и новорожденного.

## **Способ применения и дозы**

Таблетки принимают внутрь и запивают водой.

**Взрослые и подростки старше 12 лет:** по одной таблетке 3 раза в сутки.

**Дети от 6 до 12 лет:** только под наблюдением врача, по 1 - 2 таблетке в сутки, утром и днем.

Наибольший эффект препарата достигается при регулярном применении в течение нескольких недель.

Лечебное действие Деprima® проявляется спустя 10-14 дней после начала приема.

Если в течение 4-6 недель после начала лечения улучшения состояния не наступило, следует прекратить прием Деprima® и проконсультироваться с врачом.

Пациент обязательно должен сообщить своему лечащему врачу о том, что он принимает Деprima®.

## **При пропуске одного приема Деprima®**

- следует принять лекарство как можно скорее.
- если подходит время приема следующей дозы препарата, не принимайте дополнительной дозы для компенсации пропущенного приема.
- не принимайте одновременно две дозы препарата.

## **Побочные эффекты**

Желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, запор и т.п.), аллергические реакции – зуд и покраснение кожи, чувство усталости или беспокойство.

У людей с повышенной чувствительностью к солнечному свету одновременный прием солнечных ванн и препарата может вызывать ожоги (фотосенсибилизация).

При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует проконсультироваться у врача.

## **Передозировка**

Острых отравлений препаратами зверобоя у людей не отмечено.

При слишком большом количестве принятого препарата возможно усиление побочных эффектов. Меры помощи: следует отменить препарат, принять активированный уголь и обратиться к врачу.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Деprima® активирует микросомальное окисление (цитохром P 450), поэтому препарат следует принимать с осторожностью при одновременном лечении препаратами, содержащими дигоксин, противоастматическими препаратами, содержащими теофиллин, противосудорожными средствами, антидепрессантами (трициклическими, избирательными ингибиторами обратного захвата серотонина, ингибиторами MAO), препаратами против мигрени (триптаны), циклоспорином, индинавиром, резерпином и при приеме пероральных противозачаточных средств, а также может усиливать действие средств для общей анестезии и наркотических анальгетиков. В этом случае перед началом приема Деprima® следует посоветоваться с врачом.

## **Особые указания:**

Во время лечения Деprima® не рекомендуется принимать солнечные ванны или пользоваться солярием.

Во время лечения Деprima® следует воздержаться от употребления алкогольных напитков.

**Форма выпуска:**

По 10 таблеток в блистер, по 3 блистера вместе с инструкцией по применению вкладывают в картонную пачку.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

2 года.

Дата окончания срока годности отпечатана на упаковке. Не используйте лекарство по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта.

**Производитель:**


Лек д.д.

Веровшкова 57, Любляна, Словения

**Представительство в Москве:** 121002, Староконюшенный переулок, дом 10/10, стр. 1.

Тел. 258-8484, Факс 258-8485.

Директор ИДКЭЛ, проф.



В.В. Чельцов

Представитель фирмы



Е.Ю. Барманова