

**ИНСТРУКЦИЯ**  
(информация для пациента)  
по медицинскому применению препарата  
**ДИБАЗОЛ**

Регистрационный номер: РН 003623/01

Торговое название препарата: Дибазол

Международное непатентованное название: Бендазол (Bendazol)

Лекарственная форма: таблетки

Состав: 1 таблетка содержит дибазола 0,02 г. и вспомогательные вещества: сахар-рафинад, крахмал картофельный, кальция стеарат.

**Описание**

Таблетки белого или белого со слегка сероватым или желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические с фаской.

**Фармакологические свойства**

Фармакотерапевтическая группа: вазодилатирующее средство.

КОД АТС C04AX.

Дибазол обладает сосудорасширяющим, спазмолитическим и гипотензивным эффектами, оказывает стимулирующее действие на функции спинного мозга, способствует восстановлению функций периферических нервов. Обладает также умеренной иммуномодулирующей активностью.

**Показания к применению**

Дибазол применяют в качестве вспомогательного средства в комплексном лечении артериальной гипертензии.



М. М. (Монголия)

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату, заболевания, протекающие с повышенным мышечным тонусом – судорожный синдром.

С осторожностью применять Дибазол в качестве гипотензивного средства у больных пожилого возраста (уменьшение сердечного выброса).

## **Способ применения и дозы**

Дибазол применяют внутрь по 0,02-0,05 г (20-50 мг) 2-3 раза в сутки в течение 3-4 недель или более короткими курсами. Принимают Дибазол за 2 часа до еды или через 2 часа после еды.

## **Побочное действие**

Дибазол обычно хорошо переносится. При значительном повышении дозы – потливость, чувство жара, головокружение, головная боль, тошнота, аллергические реакции. При уменьшении дозы или отмены препарата эти явления быстро проходят.

## **Взаимодействия с другими лекарственными средствами**

Гипотензивное действие бендазола усиливается при одновременном применении его с антигипертензивными препаратами других фармакотерапевтических групп и диуретическими средствами. Бендазол предупреждает обусловленное бета-адреноблокаторами увеличение общего периферического сосудистого сопротивления. Фентоламин усиливает гипотензивное действие бендазола.

## **Форма выпуска**

Таблетки по 0,02 г. По 10 штук в контурную ячейковую или безъячейковую упаковку. 1 или 2 контурных упаковок помещают в пачку картонную. По 50 или 80 таблеток в банку темного стекла. Каждую банку помещают в пачку картонную.

## **Условия хранения**

Список Б. Хранить при температуре не выше 25° С.  
Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности**

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.



**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель:**

ОАО «Московская фармацевтическая фабрика»

125239, г. Москва, Фармацевтический пр-д, 1  
тел. (095) 459-34-01, факс (095) 459-41-12

Директор И.В.Кузнецов  
управляющий

В.В. Челесов



М.В. (Макаренко)

Генеральный директор  
ОАО "Московская фармацевтическая  
фабрика"  
И.В. Кузнецов  
М.В. (Макаренко)