

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ДИОКСИДИН®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Диоксидин®

Международное непатентованное или группировочное название:
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид&

Лекарственная форма: мазь для наружного и местного применения

Состав:

100 г мази содержат:

Активное вещество: гидроксиметилхиноксалиндиоксид (диоксидин) (в пересчете на 100% вещества) – 5,0 г;

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (нипагин), пропилпарагидроксибензоат (нипазол), моноглицериды дистиллированные, макрогол-1500 (полиэтиленоксид-1500), макрогол-400 (полиэтиленоксид-400) – до 100 г.

Описание:

Мазь от желтого до зеленовато-желтого цвета. При хранении допускается незначительное разжижение верхнего слоя.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробное средство - хиноксалин

Код ATХ: D08AH.

Фармакологическое действие

Антибактериальный бактерицидный препарат широкого спектра действия. Активен в отношении *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii*, *Shigella sonnei*, *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., патогенных анаэробов (*Clostridium perfringens*). Действует на штаммы бактерий, устойчивых к другим антибактериальным лекарственным средствам, включая антибиотики. Не оказывает местнораздражающего действия. Возможно развитие лекарственной устойчивости бактерий. Обработка мазью ожоговых и гнойно-некротических ран способствует более быстрому очищению раневой поверхности, стимулирует регенерацию и краевую эпителизацию и благоприятно влияет на течение раневого процесса. В экспериментальных исследованиях продемонстрировано наличие тератогенного, эмбриотоксического и мутагенного действия.

Фармакокинетика

При наружном и местном применении частично всасывается с раневой или ожоговой поверхности. Хорошо и быстро проникает во все органы и ткани, выводится почками. Не кумулирует.

Показания к применению

Раневая и ожоговая инфекция: поверхностные и глубокие гнойные раны различной локализации, в том числе с наличием глубоких гнойных полостей – абсцессы мягких тканей, флегмоны тазовой клетчатки, послеоперационные раны мочевыводящих и желчевыводящих путей, гнойный мастит. Длительно незаживающие раны и трофические язвы, флегмоны мягких тканей, инфицированные ожоги, гнойные раны при остеомиелитах, гнойничковые заболевания кожи.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, надпочечниковая недостаточность, в том числе в анамнезе, детский возраст (до 18 лет).

С осторожностью

Почечная недостаточность.

Беременность и лактация

Препарат противопоказан при беременности. Применение в период лактации возможно только при переводе ребенка на искусственное вскармливание.

Способ применения и дозы

Наружно, местно. Диоксидин® тонким слоем накладывается на пораженный участок, предварительно очищенный от гнойно-некротических масс, или предварительно смазываются им салфетки слоем толщиной 2-3 мм. В гнойные полости вводят пропитанные мазью тампоны. В зависимости от состояния раны и течения раневого процесса повязки с мазью Диоксидин® меняют ежедневно или через день. Длительность лечения до 3 недель.

Побочное действие

Возможны местные аллергические реакции, околораневой дерматит.

Передозировка

Случаи передозировки препарата Диоксидин®, мазь для наружного и местного применения, не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

При хронической почечной недостаточности дозу мази уменьшают. Назначают только при неэффективности других противомикробных средств.

Форма выпуска

Мазь для наружного и местного применения 5%.

По 30 и 40 г в тубы алюминиевые или полиэтиленовые ламинатные. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 20 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель/организация, принимающая претензии

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

603950, г. Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88


Факс: (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizpharm.ru>

По доверию ОАО «Нижфарм»



В.А. Балабаш



55678