

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

ДОКТОР МОМ®**Регистрационный номер:****Торговое название**
ДОКТОР МОМ®**Лекарственная форма**
Сироп**Состав** на 100 мл сиропа:**Активные компоненты:**

сухие экстракты, выделенные из:

Адатоды васики листьев, корней, цветков, коры (<i>Adhatoda vasika</i>).....	600 мг
Алоэ барбадосского листьев, сока и мякоти (<i>Aloe barbadensis</i>).....	500 мг
Базилика священного листьев, семян и корней (<i>Ocimum sanctum</i>).....	1000 мг
Девясила кистецветного корней (<i>Inula racemosa</i>).....	200 мг
Имбиря лекарственного корневищ (<i>Zingiber officinale</i>).....	100 мг
Куркумы длинной корневищ (<i>Curcuma longa</i>).....	500 мг
Паслена индийского корней, плодов, семян (<i>Solanum indicum</i>).....	200 мг
Перца кубебы плодов (<i>Piper cubeba</i>).....	100 мг
Солодки голой корней (<i>Glycyrrhiza glabra</i>).....	600 мг
Терминалии белерики плодов (<i>Terminalia belerica</i>).....	200 мг
и Левоментол	60 мг

вспомогательные вещества: сахароза, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, натрия бензоат, метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия, сорбиновая кислота, краситель ВQ Супра (смесь красителей хинолинового желтого и бриллиантового голубого), ароматизатор ананасовый, вода очищенная.

Описание

Сироп темно-зеленого цвета с запахом ананаса.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения

Код АТХ [R05CA10]**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат растительного происхождения; обладает бронхолитическим, муколитическим, отхаркивающим и противовоспалительным действием.

Показания к применению

Симптоматическая терапия острых и хронических заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем или кашлем с трудноотделяемой мокротой (фарингит, ларингит, в том числе «лекторский», трахеит, бронхит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 3 лет).

Применение препарата при беременности и лактации

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин назначение препарата данной группе не рекомендуется.

Способ применения и дозы

Детям: с 3 до 5 лет - по 1/2 чайной ложке (2,5 мл) 3 раза в день;
с 6 до 14 лет - по 1/2 - 1 чайной ложке (2,5 мл - 5,0 мл) 3 раза в день.

Взрослым и детям старше 14 лет:
по 5,0 - 10,0 мл 3 раза в день.

Курс лечения – 2 – 3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции

Передозировка

Сведения о передозировке препарата до настоящего времени не поступали.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами в связи с возможностью нарушения отхождения разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В 1 разовой дозе для взрослых (5,0 - 10,0 мл) содержится 3,75 – 7,50 г сахарозы, что соответствует 0,31 – 0,62 ХЕ.

Форма выпуска

Сироп. По 100 мл во флакон из темного стекла или во флакон из полиэтилентерефталата зеленого цвета, укупоренные алюминиевыми крышками с контролем первого вскрытия. Один флакон в комплекте с мерным стаканчиком из полипропилена (15 мл) и инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С.
Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта

® - товарный знак

Производится фирмой
«Юник Фармасьютикал Лабораториз»
(Отделение фирмы «Дж.Б.Кемикалс
энд Фармасьютикалс Лтд.»)
Ворли, Мумбай 400 030, Индия

Представительство в России
г. Москва 121059, ул. Брянская, д.5
Тел: (495) 662-18-11, Факс: (495) 662-18-12

Представитель фирмы



О.В. Некрасова

