

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

Иммунал®/ Immunal®

Регистрационный номер

Торговое название
Иммунал®

Лекарственная форма
Таблетки

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки светло-коричневого цвета с вкраплениями с запахом ванили.

Состав

1 таблетка содержит
активное вещество: эхинацеи пурпурной травы (*Echinacea purpurea* (L.) Moench) сок высушенный - 80 мг;
вспомогательные вещества: кремния диксид коллоидный, лактоза, магния стеарат, натрия сахаринат, ванилин, ароматизатор вишневый.

Фармакотерапевтическая группа

Иммуностимулирующее средство растительного происхождения.

Код ATX: L03AX

Фармакологические свойства

Иммунал является иммуностимулирующим препаратом, изготовленным из лекарственного растительного сырья.

Эхинацея пурпурная (*Echinacea purpurea* (L.) Moench) содержит активные вещества, усиливающие естественные защитные силы организма и действующие в качестве стимуляторов иммунитета. Повышая число лейкоцитов (гранулоцитов) и активизируя фагоцитоз, действующие вещества препарата подавляют размножение микроорганизмов в организме человека и способствуют уничтожению болезнетворных бактерий. Кроме того, установлено противовирусное действие травы эхинацеи пурпурной в отношении возбудителей гриппа и герпеса.

Показания к применению

Иммунал® рекомендуется применять для укрепления иммунитета у пациентов с неосложненными острыми инфекционными заболеваниями, предрасположенностью к частым простудам, для профилактики простудных заболеваний и гриппа, а также в качестве вспомогательного лекарственного средства при продолжительной антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунитета.

КОПИЯ ВЕРНА

РОЖКОВ О.Р.

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ



Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных;
- прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания, такие, как туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный склероз, СПИД или ВИЧ-инфекция.
- детский возраст до 4 лет

Беременность и период лактации

Данные о негативном воздействии Иммунала отсутствуют.

Перед применением препарата при беременности и в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Для маленьких детей рекомендуется растолочь таблетку и смешать с небольшим количеством жидкости.

Взрослым и подросткам старше 12 лет: по 1 таблетке три-четыре раза в день;

детям в возрасте от 6 до 12 лет: по 1 таблетке один-три раза в день;

детям в возрасте от 4 до 6 лет: по 1 таблетке один-два раза в день.

Для достижения терапевтического эффекта Иммунал® следует принимать не менее 1 недели.

Продолжительность непрерывного курса лечения не должна превышать 8 недель.

Побочные эффекты

В отдельных случаях возможно развитие реакций повышенной чувствительности, проявляющихся в виде кожной сыпи, зуда, отека лица, одышки, головокружения, снижения артериального давления.

Передозировка

Симптомы интоксикации вследствие передозировки препарата не отмечены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном приеме с иммунодепрессантами - взаимное ослабление действия.

Сообщения о каком-либо клинически значимом взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Влияние на способности к концентрации внимания

Не требуется специальных предосторожностей.

Форма выпуска

Таблетки, по 10 или 20 таблеток в блистере, по 2 блистера (по 10 таблеток) или 1 блистер (по 20 таблеток) вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной пачке.

Условия хранения

При температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.



Производитель
Лек д.д.
Веровшка 57, Любляна, Словения.

Претензии потребителей направлять в Представительство в РФ:
119002, Москва, Староконюшенный пер., д.10/10, стр.1
Тел. 258 84 84, факс 258 84 85

И.о.директора ИДКЭЛС

А.Н.Васильев

Представитель компании

Е.Ю. Барманова



КОПИЯ ВЕРНА
РОЖКОВА О. В.
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

