

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ИНДОМЕТАЦИН СОФАРМА

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Индометацин Софарма

Международное непатентованное название или группировочное название: индометацин

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав

В 100 г мази содержится:

Активное вещество: индометацин 10 г.

Вспомогательные вещества: ланолин, вазелин, диметилсульфоксид, воск пчелиный желтый, кремния диоксид коллоидный, лаванды масло.

Описание

Желтая гомогенная мазь со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП).

Код АТХ: [M02AA23]

Фармакологические свойства

Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, противоотечное действие, связанное с неселективным ингибированием циклооксигеназы-1 (ЦОГ1) и циклооксигеназы-2 (ЦОГ2), регулирующих синтез противовоспалительных простагландинов. Устраняет боль, уменьшает отек,

эритему, утреннюю скованность и припухлость суставов, способствует увеличению объема движений.

Фармакокинетика

Всасывается через кожу, накапливается в подлежащих тканях, в суставах и в синовиальной жидкости в терапевтических концентрациях. Выводится почками в виде метаболитов и в незначительном количестве в неизмененном виде, а также частично через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

Показания к применению

- Воспалительные заболевания суставов - ревматоидный артрит; анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева); хронический ювенильный артрит; подагрический артрит;
- остеоартроз различной локализации;
- заболевания околосуставных тканей - тендиниты, бурситы, тендобурситы, тендовагиниты;
- посттравматические поражения опорно-двигательного аппарата - повреждения связок, ушибы.

Противопоказания

Гиперчувствительность к индометацину и другим компонентам препарата, бронхиальная астма, ринит, крапивница и ангионевротический отек, возникшие после применения нестероидного противовоспалительного препарата, беременность и период лактации, детский возраст до 14 лет, повреждение кожных покровов в месте нанесения препарата.

С осторожностью: аллергические заболевания и реакции, при нарушении функции печени и почек (в случае нанесения на большие участки поверхности кожи), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, нарушения свертываемости крови (в т.ч. гемофилия, удлинение времени кровотечения, склонность к кровотечениям), сопутствующее применение НПВП,

печеночная порфирия (обострение), полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других НПВП (в т.ч. в анамнезе), пожилой возраст.

Способ применения и дозы

Наружно.

Мазь втирают легкими движениями, тонким слоем в кожу на болезненный участок тела по 4-5 см 3-4 раза в день (для взрослых) или по 2-2,5 см 2-3 раза в день (для детей старше 14 лет). Интервал между нанесением мази должен быть не менее 6 часов. Курс лечения - 7-10 дней.

Общее количество мази для взрослых в сутки не должно превышать 15 см, выдавливаемых из тубы, для детей старше 14 лет - 7,5 см.

Побочное действие

Иногда может возникнуть зуд и гиперемия кожи, жжение, сыпь, шелушение, сухость кожи. Редко развивается локальный отек и везикулезная сыпь, а в отдельных случаях - ангионевротический отек и одышка. При применении на большой площади поверхности кожи могут наступить системные реакции, в основном желудочно-кишечные нарушения (отсутствие аппетита, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, кровотечения и ulcerации) В единичных случаях – обострение псориаза.

Диметилсульфоксид может оказать раздражающее действие на кожу.

Ланолин может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Передозировка

Явления передозировки (в основном со стороны ЖКТ) могут наблюдаться очень редко только при длительном применении на большой площади поверхности кожи.

При непреднамеренном приеме внутрь наблюдаются жжение в слизистой

оболочке ротовой полости, слюноотделение, тошнота, рвота. Лечение при приеме внутрь – промывание ротовой полости и желудка, при необходимости симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не наблюдались при местном применении.

Особые указания

Препарат следует наносить только на неповрежденные и неинфицированные участки кожи.

Не допускать попадания в глаза, в ротовую полость, на слизистые оболочки или открытые раны, т.к. в этом случае наблюдается локальное раздражение – слезотечение, покраснение, жжение, боль (лечение – обильное промывание пораженного участка проточной водой или 0,9% раствором натрия хлорида до уменьшения или исчезновения жалоб).

При появлении сыпи лечение необходимо немедленно прекратить.

При продолжительном лечении (более 10 дней), рекомендуется провести лабораторный контроль содержания лейкоцитов и тромбоцитов. Эффективность и безопасность препарата для детей до 14 лет не установлена.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных о нарушении способности водить автомобиль и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими быстроты психомоторных реакций и повышенной концентрации внимания.

Форма выпуска и упаковка

Мазь для наружного применения 10 %.

По 40 г мази в алюминиевые тубы. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года.

Срок годности после первого вскрытия тубы: 1 месяц.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Софарма АО, Болгария

1220, София, ул. Илиенское шоссе 16


Тел.: (+359 2) 81 34 200; факс: (+359 2) 936 02 86

Представительство Софарма АО в Москве

109004, ул. Таганская, д. 17-23, эт. 10

Тел.: (495) 799 55 11; Факс: (495) 799 55 22.

Представитель фирмы



С.В.Полухин

