

ИНСТРУКЦИЯ

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП - 008586-280922

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ИНГАЛИПТ

Регистрационный номер:**Торговое наименование:** Ингалипт**Международное непатентованное или группировочное наименование:** месульфамид + мяты перечной листьев масло + сульфатиазол + тимол + эвкалипта шарикового листьев масло**Лекарственная форма:** аэрозоль для местного применения**Состав:**

1 баллон содержит:	15 мл	20 мл	30 мл	45 мл	50 мл
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Действующие вещества:

Месульфамид	0,375 г	0,500 г	0,750 г	1,125 г	1,250 г
(Сульфаниламид натрия, стрептоцид растворимый)					
Сульфатиазола натрия пентагидрат	0,375 г	0,500 г	0,750 г	1,125 г	1,250 г
(в пересчете на сульфатиазол натрия безводный)	0,281 г	0,375 г	0,563 г	0,844 г	0,938 г

Тимол	0,0075 г	0,01 г	0,015 г	0,0225 г	0,025 г
Эвкалипта шарикового листьев масло	0,0075 г	0,01 г	0,015 г	0,0225 г	0,025 г

Мяты перечной листьев масло	0,0075 г	0,01 г	0,015 г	0,0225 г	0,025 г
-----------------------------	----------	--------	---------	----------	---------

Вспомогательные вещества:

Этанол (спирт этиловый) 95 %	0,9 г	1,2 г	1,8 г	2,7 г	3,0 г
Сахаринат натрия	0,0225 г	0,03 г	0,045 г	0,0675 г	0,075 г
Глицерол (глицерин)	1,05 г	1,40 г	2,10 г	3,15 г	3,50 г
Полисорбат-80 (твин-80)	0,45 г	0,60 г	0,90 г	1,35 г	1,50 г
Вода очищенная	до 15 мл	до 20 мл	до 30 мл	до 45 мл	до 50 мл
Азот	0,15 - 0,2 г	0,20 - 0,27 г	0,3 - 0,4 г	0,45 - 0,6 г	0,5 - 0,67 г

Описание: жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство комбинированное

Код ATХ: R02AA20

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения. Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки). Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной листьев масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

Фармакокинетика

Препарат образует терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге воспаления. Частично всасываются сульфаниламидные препараты, которые связываются с белками крови: стрептоцид растворимый на 12-14 %, сульфатиазол натрия на 55 %. В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов, в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида составляет 10 ч., сульфатиазола натрия - 1-2 ч.

Показания к применению

Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, детский возраст (до 3 лет), беременность, период грудного вскармливания.

Дефицит сахаразы/изомальтозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата Ингалипт при беременности и в период грудного вскармливания. В состав препарата входят сульфаниламиды, которые проникают через плаценту и обнаруживаются в крови плода. Возможно развитие тератогенного действия.

При необходимости использования препарата в период грудного вскармливания необходимо прекратить грудное вскармливание, т.к. сульфаниламиды проникают в грудное молоко и могут вызвать ядерную желтуху у новорожденных.

Способ применения и дозы

Местно. Сняв предохранительный колпачок с баллона и надев прилагаемый распылитель, распыляют взвесь в полость рта в течение 1-2 секунды. Препарат удерживают в полости рта 5-7 минут. Орошение проводится 3-4 раза в сутки с предварительным прополосканием рта кипяченой водой.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Во избежание снижения эффективности препарата рекомендуется воздерживаться от приема пищи и жидкости в течение 30 мин после орошения.

Курс лечения не более 7 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения или першения в горле.

При проявлении побочных реакций необходимо отменить применение препарата и обратиться к врачу.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата.

Лечение: специфический антидот отсутствует, проводятся симптоматическая и поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Применение препарата Ингалипт у детей возможно только по рекомендации врача.

Баллон не вскрывать и не нагревать. Предохранять от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

Лекарственный препарат содержит этиловый спирт 95 % (0,9 г/15 мл, 1,2 г/20 мл, 1,8 г/30 мл, 2,7 г/45 мл, 3,0 г/50 мл).

Препарат содержит сахарозу, что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Ингалипт не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнению работ, требующих повышенной скорости психомоторных реакций.

Форма выпуска

Аэрозоль для местного применения.

По 15, 20, 30, 45, 50 мл в баллоне аэрозольном из алюминия, с клапаном непрерывного действия, с колпачком и распылительной насадкой.

Баллон маркируют методом печати краской или наклеивают этикетку.

Каждый баллон с распылителем и инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения:

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Производитель:

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Организация, принимающая претензии потребителей:

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел. (8332) 22-01-26

E-mail: kachestvo-s@k-ff.ru

www.k-ff.ru

Генеральный директор

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

С.Н. Федотовский



137898

5