

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ихтиол

Номер регистрационного удостоверения:

Торговое наименование

Ихтиол

Международное непатентованное или группировочное наименование

Ихтаммол

Лекарственная форма

Мазь для наружного применения

Состав:

Действующее вещество: ихтаммол – 10 г или 20 г.

Вспомогательное вещество: вазелин – до 100 г.

Описание

Мазь темно-коричневого цвета с запахом ихтиола.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты, применяемые в дерматологии.

Код АТХ: D11AX

Фармакологическое действие

Противовоспалительное средство, оказывает противомикробное (бактерицидное в отношении *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus pyogenes*), кератопластическое действие. Ускоряет созревание фурункулов. При непосредственном действии на кожу вызывает слабое раздражение чувствительных нервных окончаний, сменяющееся снижением их чувствительности, что приводит к возникновению рефлексов, изменяющих трофику тканей. Вызывает денатурацию белковых молекул.

Фармакокинетика

После нанесения на неповрежденную кожу под окклюзионную повязку медленно всасывается. Системная абсорбция составляет 5-10 %. Подвергшаяся абсорбции часть тиофенольных компонентов ихтаммола выделяется в желчь и удаляется из организма через кишечник.

Показания к применению

Рожа, экзема, пиодермия (в т. ч. фурункулез).

Противопоказания

Гиперчувствительность к ихтаммолу или к любому из вспомогательных веществ.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата показано, если ожидаемая польза для матери превосходит возможный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно. Наносят на пораженные участки кожи 1-2 раза в день. При необходимости используют повязку.

Побочное действие

Классификация частоты возникновения побочных реакций:

очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100, < 1/10$); нечасто ($\geq 1/1000, < 1/100$); редко ($\geq 1/10000, < 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$), включая отдельные сообщения, частота неизвестна – по имеющимся данным установить частоту возникновения не представлялось возможным. Возможны местные аллергические реакции.

Передозировка

Маловероятна в связи с низкой системной абсорбцией.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не совместим с растворами солей йода, алкалоидами, солями тяжелых металлов, оксидом цинка. Диметилсульфоксид, спирт этиловый и глицерол при одновременной аппликации с мазью ихтиоловой усиливают системную абсорбцию ихтаммола и увеличивают глубину его проникновения в мягкие ткани.

Особые указания

Мазь предназначена только для наружного применения, не рекомендуется наносить на открытые раны. Не допускать попадания на слизистые оболочки рта, глаз.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 10 %, 20 %.

По 25 г в банки из стекломассы с треугольным венчиком с крышкой натягиваемой.

По 25 г в тубы алюминиевые с колпачками из полиэтилена.

Каждую тубу или банку помещают в пачку картонную вместе с инструкцией по применению.

Допускается упаковка банок или туб вместе с равным количеством инструкций по применению в коробку картонную групповой упаковки.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73.