

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Йодантипирин

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.

- *Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*
- *Это лекарство назначено лично Вам, его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

Торговое наименование: Йодантипирин

Химическое название: 1-фенил-2,3-диметил-4-йодпирозолон

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

Активное вещество: йодантипирин 100 мг

Вспомогательные вещества:

Крахмал картофельный 26 мг

Глюкоза 29 мг

Магния стеарат 1 мг

Поливинилпирролидон низкомолекулярный 5 мг

медицинский (повидон)

Масса таблетки 161 мг

Описание

Таблетки белого цвета без запаха или со слабым специфическим запахом, плоскоцилиндрической формы, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Противовирусное средство

Код АТХ: J05AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Йодантипирин обладает противовоспалительными, иммуностимулирующими и интерферогенными свойствами. Стабилизирует биологические мембраны и задерживает проникновение вируса в клетку. Является активным индуктором альфа и бета интерферона, стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет. Активен в отношении вируса клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Фармакокинетика. Быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, биодоступность составляет 80%. До 95% метаболизируется в печени. Экскреция с мочой через почки путем активного транспорта в почечные канальцы: 3-5% в неизменном виде, 80-90% - неактивные метаболиты. Имеет высокое сродство к тканевым белкам. Связывание с белками крови составляет 25%. Период полувыведения - около 6 часов.

Показания для медицинского применения

Йодантипирин применяется для лечения и профилактики клещевого энцефалита у взрослых; для комплексного лечения геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Режим дозирования, способ применения

Таблетки Йодантипирина принимают внутрь после еды.

Профилактика и лечение клещевого энцефалита.

Лечение:

По 300 мг (3 таблетки) - 3 раза в день в течение первых 2-х дней; по 200 мг (2 таблетки) - 3 раза в день в течение следующих 2-х дней; по 100 мг (1 таблетка) - 3 раза в день в течение следующих 5-ти дней.

Профилактика:

а) после присасывания клеща:

по 300 мг (3 таблетки) - 3 раза в день в течение первых 2-х дней; по 200 мг (2 таблетки) - 3 раза в день в течение следующих 2-х дней; по 100 мг (1 таблетка) - 3 раза в день в течение следующих 5-ти дней.

б) в период пребывания в местах связанных с возможным присасыванием клещей:

по 200 мг (2 таблетки) 1 раз в день в течение всего периода;

по 200 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 2-х дней перед посещением мест, связанных с возможным присасыванием клещей.

Лечение геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

Препарат должен быть назначен в течение пяти дней от начала заболевания.

По 200 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение первых четырех дней;

по 100 мг (1 таблетка) 3 раза в день в течение следующих пяти дней.

Возможные побочные реакции при медицинском применении лекарственного препарата

Препарат малотоксичен, достаточно хорошо переносится. В отдельных случаях возможны диспепсические явления, кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек и другие аллергические реакции. При прекращении приема препарата данные явления исчезают.

В случае развития любой побочной реакции как можно скорее обратитесь к врачу. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Противопоказания для медицинского применения

Индивидуальная непереносимость Йодантипирина и других йодсодержащих препаратов, гиперфункция щитовидной железы, выраженные нарушения функции печени и почек, беременность и период лактации, детский возраст.

Симптомы передозировки, меры по оказанию помощи при передозировке

Для предупреждения передозировки, необходимо строго соблюдать режим дозирования. По показаниям — симптоматическая терапия.

Особые указания:

При лечении и профилактике клещевого энцефалита не рекомендуется совместное применение Йодантипирина и противоклещевого иммуноглобулина. При очаговых формах клещевого энцефалита вначале назначается специфический

иммуноглобулин по обычной схеме и через 2-3 дня назначают Йодантипирин в указанных дозировках.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Антацидные препараты и антагонисты H_2 рецепторов уменьшают всасывание препарата. При совместном приеме с пероральными сахароснижающими препаратами, барбитуратами, трициклическими антидепрессантами, антикоагулянтами непрямого действия Йодантипирин усиливает их действие, вытесняя их из связи с белками.

Форма выпуска

Таблетки по 100 мг. По 10 таблеток в контурной ячейковой или безъячейковой упаковке. По 1, 2 или 5 контурных упаковок вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

По 50 таблеток в банке полимерной. Каждая банка вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. 1000 контурных безъячейковых упаковок вместе с инструкциями по применению в коробке из гофрокартона (для стационаров).

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска


По рецепту врача.

Владелец регистрационного удостоверения:

ООО "Наука Техника Медицина". 634028, г. Томск, ул. Карпова, 23/1.

Производитель, адрес места производства:

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», 634009, г. Томск, пр. Ленина, 211

Генеральный директор ООО «ЭР ЭНД ДИ ФАРМА»  В. В. Иванов: