

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Йокс®-Тева**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Йокс®-Тева

**Международное непатентованное наименование или группировочное наименование:**

Аллантоин + Повидон-Йод

**Лекарственная форма:** спрей для местного применения

**Состав на 1 флакон**

*Действующие вещества:* повидон-йод 2,550 г, аллантоин 0,030 г.

*Вспомогательные вещества:* левоментол 0,300 г, кислоты лимонной моногидрат 0,060 г, натрия цитрата дигидрат 0,060 г, этанол 96 % 6,00 г, пропиленгликоль 9,00 г, вода очищенная до 30,00 мл.

**Описание**

Прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость красно-коричневого цвета со специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство

**Код АТХ:** А01АD; R02АА15


**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат для местного применения при заболеваниях полости рта и ЛОР-органов. При контакте с кожей или слизистыми оболочками выделяет йод; оказывает антисептическое и противовоспалительное действие.

Препарат обладает широким спектром противомикробного действия, активен в отношении бактерий, грибов, вирусов, простейших.

**Показания к применению**

1. Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, в том числе: ангины, тонзиллиты, тонзилофарингиты, глосситы, стоматиты, афты.
2. Для обработки полости рта и глотки при хирургических вмешательствах на дыхательных путях и полости рта и в послеоперационном периоде.
3. Для лечения инфекций полости рта и горла, возникающих при химиотерапии.
4. При стрептококковых ангинах применяется как дополнительное средство при лечении антибиотиками.



## Противопоказания


- Повышенная чувствительность к йоду и другим компонентам препарата;
- беременность и период кормления грудью;
- дети до 8 лет;
- нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз);
- сердечная недостаточность;
- герпетиформный дерматит Дюринга;
- одновременное применение радиоактивного йода.

## Способ применения и дозы


Местно.

*Инструкция для пациентов по использованию аппликаторов:*


Дозированное распределение препарата из флакона осуществляется с помощью механического распылителя и аппликатора (см. рис. А1 или А2)



1. Если аппликатор помещен в полиэтиленовый пакет, извлеките его из пакета с помощью ножниц или аналогичного инструмента (см. рис. В2).



2. Проверьте целостность аппликатора. При повреждении аппликатора, его использование запрещено.
3. Снимите защитную крышку с механического распылителя.
4. Установите аппликатор на флакон (см. рис. В3).



5. Нажмите 2-3 раза, чтобы раствор прошел через распылитель, после чего начнется распыление препарата.

6. Поместите трубку аппликатора на 2 - 3 см в полость рта, задержите дыхание и нажмите на аппликатор 2 раза, при этом при первом нажатии распыляйте препарат в правую сторону, а при втором - в левую. При распылении удерживайте флакон в вертикальном положении.

Перед использованием промывайте аппликаторы горячей водой и всегда проверяйте их целостность. Запрещается пользоваться поврежденным аппликатором.

Использовать препарат Йокс®-Тева спрей рекомендуется 2 - 4 раза в день.

В случае необходимости препарат можно применять чаще - через каждые 4 часа.

#### **Побочное действие**

Препарат Йокс®-Тева спрей обычно переносится хорошо.

В отдельных случаях возможны реакции повышенной чувствительности к препарату и проявление аллергической реакции на йод (зуд, гиперемия), что требует отмены препарата.

Длительное применение препарата может вызвать явление йодизма (в том числе: металлический вкус, повышенное слюноотечение, отеки глаз или гортани), при появлении которого следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не рекомендуется одновременное применение препарата Йокс®-Тева с другими антисептическими средствами, предназначенными для местного применения в полости рта и глотки, особенно содержащими перекись водорода, в связи с инактивацией препарата.

#### **Особые указания**

Не применять внутрь!

Не следует вдыхать или проглатывать препарат!

#### **Форма выпуска**

Спрей для местного применения.

По 30 мл во флаконы из ПЭТ (полиэтилентерефталата), снабженные механическим распылителем и крышкой, предохраняющей распылитель. Каждый флакон в комплекте с аппликатором и инструкцией по применению помещают в картонную пачку, на которую дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки.

Аппликатор может быть как в полиэтиленовом пакетике, так и без него.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от света.

Не хранить в холодильнике. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте!

#### **Срок годности**

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель**

Тева Чешские Предприятия с.р.о.,

ул. Оставска 305/29, 747 70 Опава-Комаров, Чешская Республика

**Наименование держателя (владельца) регистрационного удостоверения лекарственного препарата**

Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль

**Организация, принимающая претензии потребителей**

ООО «Тева», 115054, Москва, ул. Валовая, 35,

тел.: +7 (495) 644 22 34, факс: +7 (495) 644 22 35

Адрес в интернете: [www.teva.ru](http://www.teva.ru)

Менеджер по регистрации



Лотышева О.В.