

Листок-вкладыш – информация для пациента

Кагоцел[®], 12 мг, таблетки

Действующее вещество: кагоцел

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Кагоцел[®], и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Кагоцел[®].
3. Прием препарата Кагоцел[®].
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Кагоцел[®].
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Кагоцел[®], и для чего его применяют

Препарат Кагоцел[®] содержит действующее вещество кагоцел и относится к группе противовирусных средств. Его принимают для лечения и профилактики вирусных инфекций.

Показания к применению

Препарат Кагоцел[®] применяется у взрослых и детей в возрасте от 3 лет в качестве профилактического и лечебного средства при гриппе и других острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). А также препарат применяется у взрослых в возрасте от 18 лет при герпесе.

Способ действия препарата

Основным механизмом действия препарата Кагоцел[®] является способность повышать

выработку интерферонов (белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса). И тем самым вызывать противовирусный ответ организма на воздействие вирусов. Наибольшая эффективность при лечении препаратом Кагоцел[®] достигается при его назначении не позднее 4-го дня от начала острой инфекции.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Кагоцел[®]

Противопоказания

Не принимайте препарат Кагоцел[®]:

- если у Вас аллергия на кагоцел или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- если Вы беременны или кормите ребенка грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Кагоцел[®] проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Для достижения лечебного эффекта прием препарата следует начинать не позднее четвертого дня от начала заболевания.

Дети

Не давайте препарат Кагоцел[®] детям в возрасте от 0 до 3 лет для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ и детям в возрасте от 0 до 18 лет для лечения герпеса, вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности.

Другие препараты и препарат Кагоцел[®]

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Кагоцел[®] хорошо сочетается с другими противовирусными препаратами, иммуномодуляторами (препаратами, влияющими на иммунную систему) и антибиотиками.

При возникновении вопросов, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не принимайте препарат Кагоцел[®] во время беременности и в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние препарата на способность к управлению транспортными средствами, механизмами не изучено. Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед тем, как управлять транспортными средствами или другими механизмами.

Препарат Кагоцел® содержит лактозу

Препарат содержит лактозу, если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. Прием препарата Кагоцел®

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые

Для лечения гриппа и ОРВИ взрослым назначают в первые два дня – по 2 таблетки 3 раза в день, в последующие два дня – по одной таблетке 3 раза в день. Всего на курс – 18 таблеток, длительность курса – 4 дня.

Профилактика гриппа и ОРВИ у взрослых проводится 7-дневными циклами: два дня – по 2 таблетки 1 раз в день, 5 дней перерыв, затем цикл повторить. Длительность профилактического курса – от одной недели до нескольких месяцев.

Для лечения герпеса у взрослых назначают по 2 таблетки 3 раза в день в течение 5 дней. Всего на курс – 30 таблеток, длительность курса – 5 дней.

Применение у детей

Для лечения гриппа и ОРВИ детям в возрасте от 3 до 6 лет назначают в первые два дня – по 1 таблетке 2 раза в день, в последующие два дня – по одной таблетке 1 раз в день. Всего на курс – 6 таблеток, длительность курса – 4 дня.

Для лечения гриппа и ОРВИ детям в возрасте от 6 лет назначают в первые два дня – по 1 таблетке 3 раза в день, в последующие два дня – по одной таблетке 2 раза в день. Всего на курс – 10 таблеток, длительность курса – 4 дня.

Профилактика гриппа и ОРВИ у детей в возрасте от 3 лет проводится 7-дневными циклами: два дня – по 1 таблетке 1 раз в день, 5 дней перерыв, затем цикл повторить. Длительность профилактического курса – от одной недели до нескольких месяцев.

Не превышайте максимальную рекомендуемую суточную дозу!

Путь и (или) способ введения

Внутри, независимо от приема пищи.

Продолжительность терапии

Дозы и продолжительность лечения определяются лечащим врачом индивидуально в зависимости от заболевания. Длительность профилактического курса – от одной недели до нескольких месяцев. При возникновении вопросов обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Если Вы приняли препарата Кагоцел® больше, чем следовало

Если Вы приняли больше препарата, чем следовало, сообщите об этом лечащему врачу.

При случайной передозировке обратитесь к лечащему врачу или в отделение неотложной медицинской помощи. Вам могут назначить обильное питье, вызвать рвоту.

Если Вы забыли принять препарат Кагоцел®

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Если Вы забыли принять препарат в нужное время, примите следующую таблетку и следуйте своему обычному графику дозирования. При возникновении вопросов обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Если Вы прекратили прием препарата Кагоцел®

Важно окончить курс лечения, даже если через несколько дней Вы почувствуете себя лучше. Если Вы прекратите принимать препарат слишком рано, вирусное заболевание может быть не полностью вылечено и его симптомы могут возвратиться или ухудшиться. При возникновении вопросов обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Кагоцел® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Кагоцел® и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения одного из следующих признаков появления отека Квинке

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- опухание век, лица, языка, затруднение дыхания и/или глотания, осиплость голоса (отек Квинке);
- аллергическая кожная реакция с появлением волдырей на коже и выраженного зуда (крапивница).

Другие нежелательные реакции при приеме препарата Кагоцел®

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить

невозможно):

- тошнота;
- понос (диарея);
- боли в области желудка (гастралгия);
- сыпь;
- зуд кожи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства-члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон: +375 17 231-85-14

Факс: +375 17 252-53-58

Телефон отдела фармаконадзора: +375 17 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

www.rceth.by

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве
Здравоохранения Кыргызской Республики.

720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25

Телефон: +996 312 21-92-78

Электронная почта: dlsmi@pharm.kg

<http://pharm.kg>

5. Хранение препарата Кагоцел®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке препарата после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (в пачке).

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Кагоцел® содержит

Действующее вещество: кагоцел

Каждая таблетка препарата Кагоцел® содержит 12 мг кагоцела.

Прочими вспомогательными веществами являются: крахмал картофельный, кальция стеарат, комплексное вспомогательное вещество [лактозы моногидрат, повидон, кросповидон] или лактозы моногидрат, повидон, кросповидон.

Внешний вид препарата Кагоцел® и содержимое упаковки

Таблетки.

Препарат представляет собой таблетки от белого с коричневатым оттенком до светло-коричневого цвета круглые двояковыпуклые с вкраплениями коричневого цвета.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке с перфорацией или по 10, 15 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке без перфорации.

1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток, или 1 контурную ячейковую упаковку по 20 таблеток, или 2 контурные ячейковые упаковки по 15 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

Адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17

Телефон: +7 495 646-28-68

Электронная почта: info@binnopharmgroup.ru

Производитель

Российская Федерация

ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА», Россия.

Адрес: Калужская область, г. о. «город Обнинск», г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 120, корп. 7.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения.

Российская Федерация

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

Адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 стр. 5, этаж 3, помещ. 17

Телефон: +7 495 646-28-68

Электронная почта: info@binnopharmgroup.ru

Республика Беларусь

АНО «Национальный научный центр фармаконадзора»

Адрес: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, д.6, стр. 2, этаж 9, офис 923

Телефон: +7 499 504-15-19, +7 903 799-21-86

Электронная почта: adversereaction@drugsafety.ru

Кыргызская Республика

АНО «Национальный научный центр фармаконадзора»

Адрес: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, д.6, строение 2, этаж 9, офис 923

Телефон: +996 99 901-50-45, +7 499 504-15-19

Электронная почта: adversereaction@drugsafety.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате Кагоцел® содержатся на веб-сайте Союза <https://ees.eaeunion.org>

Листок-вкладыш доступен на всех языках Союза на веб-сайте Союза.