

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата  
**АБОМИН®**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название:** Абомин®

**Лекарственная форма:** таблетки

**Состав на одну таблетку**

*Активное вещество:* \* абомин® - 200 мг;

*Вспомогательных веществ:* крахмал картофельный, кальция стеарат – до получения таблетки массой 0,24 г.

\*Абомин представляет собой сычужные ферменты телят и ягнят молочного возраста (с содержанием лактозы не менее 70 %) 50000 МЕ.

**Описание**

Таблетки двояковыпуклой формы от светло-желтого до желтовато-серого цвета со слабым специфическим запахом, свойственным сычужному ферменту.

Допускаются вкрапления различной степени интенсивности, неоднородно распределенные на поверхности таблетки.

**Фармакотерапевтическая группа:** пищеварительное ферментное средство.


**Код АТХ:** А09АА

**Фармакологические свойства**

Абомин – препарат, получаемый из слизистой оболочки желудка телят и ягнят молочного возраста. Содержит сумму протеолитических ферментов, действующих на пищевые (преимущественно молочные) белки. Улучшает процесс пищеварения при недостаточности ферментной активности желудочного сока.

**Показания к применению.**

Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся нарушением переваривающей способности желудочного сока (ахилия, гипо- и анацидные



гастриты, диспепсия, состояния после резекции желудка, гастрит, гастроэнтерит, энтероколит и др.).

#### **Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 14 лет (для данной лекарственной формы).

#### **Способ применения и дозы.**

Дети старше 14 лет и взрослые - внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки во время еды в течение 1-2 мес. При недостаточной эффективности разовая доза может быть увеличена до 2-3 таблеток на прием, а курс лечения продлен до 3 месяцев. При острых гастритах, гастроэнтеритах и колитах – по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 2-3 дней.

#### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, тошнота, изжога.

#### **Форма выпуска**

Таблетки 50000 МЕ.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку или в контурную ячейковую упаковку.

1, 2, 3 контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

400 контурных безъячейковых упаковок вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в ящик из гофрированного картона.

#### **Условия хранения.**

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности.**

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта врача.



**Претензии от покупателей принимает предприятие-производитель:**

ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А.Семашко»

115172, г. Москва, ул. Б. Каменщики, д.9

Тел/факс (495) 912-71-61

И.о. директора ИДКЭЛС

А.Н. Васильев



Зам. Генерального директора  
ОАО «Мосхимфармпрепараты»  
им. Н.А. Семашко»

А.А. Трифионов

