

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Бонафтон®**

**мазь для местного и наружного применения 0,5%**

Открытое акционерное общество  
«Муромский приборостроительный завод» (ОАО «МПЗ»), Россия

**Регистрационный номер:**

**Торговое название:** Бонафтон®

**МНН или группировочное название:** бромнафтохинон &

**Химическое название:** 6-бром-1,2-нафтохинон

**Лекарственная форма:** мазь для местного и наружного применения

**Состав**

100 г мази содержат:

*Активное вещество:* бромнафтохинон -0,5 г.;

*Вспомогательное вещество:* вазелин - до 100 г.

**Описание**

Мазь от оранжевого до буровато-оранжевого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Противовирусное средство для местного применения.

**Код АТХ:** [D06 ВВ].

**Фармакологические свойства**

Противовирусный препарат, активен в отношении вируса Herpes simplex и некоторых адено-вирусов. Подавляет синтез цитоплазматических белков, включающих в состав капсидов, и нарушает транспорт компонентов вирусного капсида в клеточное ядро, где осуществляется их «сборка».

**Фармакокинетика**

Данные по фармакокинетике препарата отсутствуют.

**Показания к применению**

Вирусные заболевания кожи, слизистых оболочек полости рта и гениталий (герпес простой, опоясывающий; кондилома остроконечная), герпетический стоматит и гингивит.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Беременность и период лактации.

Детский возраст до 18 лет.

**Способ применения и дозы**

Местно, наружно. При простом и опоясывающем герпесе препарат наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 3-4 раза в сутки (в области гениталий - 4-6 аппликаций в день). Лечение проводят 3 циклами по 5 дней с 1-2 -дневными перерывами или 2 цикла по 10 дней с 3-5 - дневным перерывом. При заболеваниях слизистой оболочки полости рта препарат наносят на пораженные участки тонким слоем 4-6 раз в день (курс лечения - 3-20 дней в зависимости от тяжести заболевания).

Для лечения остроконечных кондилом применяют препарат 2 раза в сутки в течение 2 недель.

Лечение мазью комбинируют с приемом внутрь Бонафтона таблеток, растворимых в кишечнике.

**Побочное действие**

Аллергические реакции. Дерматит.

**Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки препарата не зарегистрировано.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Фармакологического взаимодействия с другими препаратами не выявлено.

**Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами**

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально

опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и т.п.).

#### **Форма выпуска**

Мазь для местного и наружного применения 0,5 % по 15 г или 25 г в тубы алюминиевые. Вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года. Не применять препарат по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

По рецепту.

#### **Производитель**

Открытое акционерное общество

"Муромский приборостроительный завод" (ОАО «МПЗ»), Россия

Претензии потребителей направлять по адресу:

602205, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д.7,  
факс (49234) 6-02-52, тел.6-34-71

Представитель ОАО «МПЗ»,  
начальник КТО ПЛС

Г.Г. Осокова

